

Liste der Brutvögel im Stadtkreis Pforzheim (Stand: 2009 bzw. 2013)

Nach HEINZ, M. & G. VÖGELE (1985), MAAS, I. (1989), SIEDLE, K. in BRUNS et al. (1994), VITZTHUM, G. (1999, mdl. Mitt.), HEINZ (1999, mdl. Mitt.), VÖGELE, G. (2011) und Beobachtungen des Amtes für Umweltschutz der Stadt Pforzheim.

Erklärung der Kürzel:

Bestand in Pforzheim: [+] = sehr selten, + = selten, ++ = nicht selten, +++ = häufig;

Rote Liste: 2 = Kategorie 2, stark gefährdet, 3 = Kategorie 3, gefährdet, V = Kategorie Arten der Vorwarnliste, - = nicht gefährdet

**NACH BAUER, H.-G., M. BOSCHERT, M.I. FÖRSCHLER, J. HÖLZINGER, , M. KRAMER & U. MAHLER (2016): *Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs. 6. Fassung, Stand 31.12.2013 – Naturschutz-Praxis Artenschutz* 11.

Nr.	Brutvogelart (in alphabetischer Reihenfolge der deutschen Namen)	Bestand in Pforzheim (Stand 2009)*	Rote Liste Ba.-Wü. 2013 **
1	Amsel (<i>Turdus merula</i>)	+++	-
2	Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)	++	-
3	Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>)	+	V
4	Baumpieper (<i>Anthus trivialis</i>)	+	2
5	Blässhuhn (<i>Fulica atra</i>)	+	-
6	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	+++	-
7	Bluthänfling (<i>Acanthis cannabina</i>)	+	2
8	Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	+++	-
9	Buntspecht (<i>Dendrocopos major</i>)	++	-
10	Dohle (<i>Corvus monedula</i>)	[+]	-
11	Dompfaff (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	+	-
12	Dorngrasmücke (<i>Sylvia communis</i>)	+	-
13	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	+++	-
14	Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	+	V
15	Elster (<i>Pica pica</i>)	+++	-
16	Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	+	-
17	Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)	+	3
18	Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>)	+	2
19	Feldsperling (<i>Passer montanus</i>)	+	V
20	Fichtenkreuzschnabel (<i>Loxia curvirostra</i>)	++	-
21	Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	+	3
22	Gartenbaumläufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	++	-

23	Gartengrasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	+	-
24	Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	+	V
25	Gebirgsstelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	++	-
26	Gelbspötter (<i>Hippolais icterina</i>)	+	3
27	Girlitz (<i>Serinus serinus</i>)	+	-
28	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	+	V
29	Grauschnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)	++	V
30	Grauspecht (<i>Picus canus</i>)	+	2
31	Grünling (<i>Carduelis chloris</i>)	+++	-
32	Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	+	-
33	Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)	+	-
34	Halsbandschnäpper (<i>Ficedula albicollis</i>)	[+]	3
35	Haubenmeise (<i>Parus cristatus</i>)	++	-
36	Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	++	-
37	Haussperling (<i>Passer domesticus</i>)	+	V
38	Heckenbraunelle (<i>Prunella modularis</i>)	++	-
39	Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)	++	-
40	Hohлтаube (<i>Columba oenas</i>)	+	V
41	Kernbeißer (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	+	-
42	Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)	+	V
43	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	+++	-
44	Kleinspecht (<i>Picoides minor</i>)	+	V
45	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	+++	-
46	Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)	+	-
47	Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)	[+]	2
48	Mauersegler (<i>Apus apus</i>)	++	V

49	Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	++	-
50	Mehlschwalbe (<i>Delichon urbica</i>)	+	V
51	Misteldrossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	++	-
52	Mittelspecht (<i>Picoides medius</i>)	+	-
53	Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	+++	-
54	Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)	+	-
55	Rabenkrähe (<i>Corvus corone corone</i>)	++	-
56	Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	+	3
57	Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	++	-
58	Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	+++	-
59	Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)	+	-
60	Schleiereule (<i>Tyto alba</i>)	++	-
61	Schwanzmeise (<i>Aegithalos caudatus</i>)	++	-
62	Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)	+	-
63	Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>)	+	-
64	Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	++	-
65	Sommergoldhähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)	++	-
66	Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)	+	-
67	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	++	-
68	Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)	++	-
69	Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)	+++	V
70	Straßentaube (<i>Columba livia domestica</i>)	+++	-
71	Sumpfmeise (<i>Parus palustris</i>)	+	-
72	Sumpfrohrsänger (<i>Acocephalus palustris</i>)	+	-
73	Tannenmeise (<i>Parus ater</i>)	+++	-
74	Teichhuhn (<i>Gallinula chloropus</i>)	++	3

75	Teichrohrsänger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	+	-
76	Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	+	2
77	Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>)	+	-
78	Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	+	V
79	Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i>)	+	-
80	Waldbaumläufer (<i>Certhia familiaris</i>)	++	-
81	Waldkauz (<i>Strix aluco</i>)	+	-
82	Waldlaubsänger (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	++	2
83	Waldohreule (<i>Asio otus</i>)	+	-
84	Waldschnepfe (<i>Scolopax rusticola</i>)	+	V
85	Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i>)	+	-
86	Wasseramsel (<i>Cinclus cinclus</i>)	++	-
87	Weidenmeise (<i>Parus montanus</i>)	+	V
88	Wendehals (<i>Jynx torquilla</i>)	+	2
89	Wintergoldhähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	++	-
90	Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	+++	-
91	Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	++	-
92	Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	+	2

Durchzügler & Wintergäste

Auf ihrem regelmäßig stattfindenden Zug im Frühjahr und im Herbst machen einige Vogelarten Zwischenstation im Stadtkreis Pforzheim. Sie stammen zumeist aus Nord- und Nordosteuropa. Im Unterschied zu den Wintergästen bleiben die **Durchzügler** nur eine kurze Zeit, um auszuruhen und Nahrung aufzunehmen. Zu erwähnen sind hier z.B. **Birkenzeisig, Braunkehlchen, Dohlen, Flussuferläufer, Goldammer, Kiebitz, Kornweihe, Kranich, Halsbandschnäpper, Milane, Ringdrossel, Saatkrähen, Schwarzstorch, Trauerschnäpper, Wacholderdrosseln, Weißstorch, Wiedehopfe, Raubwürger, Silberreiher, Steinschmätzer, Stieglitz, Wintergoldhähnchen.** Durchzügler ziehen weiter zu ihren Winterquartieren in Südeuropa und Afrika.

Die eigentlichen **Wintergäste** verbringen bei uns den gesamten Winter. Vor allem **Wasservögel** (z.B. **Reiherente, Gänsesäger, Krickente, Pfeifente, Brautente, Graugans, Kanadagans, Kormoran, Lachmöwe, Mandarinente, Haubentaucher, Schellente, Schnatterente, Spießente, Tafelente**)

halten sich im Bereich naturnaher Gewässerstrecken im Raum Pforzheim auf. **Rotdrosseln** und **Raufußbussarde** konnten schon mehrfach beobachtet werden. Einzelne überwinternde Arten kommen in größeren Schwärmen zu uns – Z.B. **Saatkrähen** (*Corvus frugilegus*), **Seidenschwänze** (*Bombycilla garrulus*) und **Bergfinken** (*Fringilla montifringilla*). Alle Arten leben im Sommerhalbjahr in Sibirien bzw. auch in Skandinavien.

Zur Entwicklung der Vogelarten im Stadtkreis Pforzheim

- Grundsätzlich haben sich die Daseinsbedingungen für die Brutvögel im Stadtkreis Pforzheim zwangsläufig im Laufe der letzten Jahrzehnte verschlechtert. Flächenverbrauch und Flächenversiegelung, Intensivierung der Landwirtschaft (Monokulturen, Maschineneinsatz, Pestizid-Einsatz, Beseitigung von Lebensraum-Elementen wie z.B. Hecken und Totholz), Bejagung – im Sommerlebensraum bzw. auf dem Zug –, Verlust von Nistquartieren auch im Siedlungsbereich, Vogelschlag an Glasflächen und im Verkehr, Hungertod im Winter aufgrund fehlender Nahrungsquellen in ausgeräumten Landschaften usw. sind die wichtigsten Faktoren.
- Folgende vor 30 Jahren noch in Pforzheim heimische Brutvogelarten sind vollständig verschwunden: Braunkehlchen, Haubenlerche, Pirol, Wachtel, Fasan, Kiebitz, Rebhuhn, Ziegenmelker, Graumammer, Nachtigall, Steinkauz.

Literatur:

HEINZ, M., HEPP, KARLFRIED, RAISIN, GERHARD & GERHARD VÖGELE: Vogelwelt und Vogelschutz. In: Naturschutz im Stadtkreis Pforzheim. Führer durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, Bd. 11. Karlsruhe und Pforzheim 1985.

VÖGELE, GERHARD: Die Vögel der Stadt Pforzheim – Arten- und Biotopschutz. Selbstverlag 2011.